

Zusatzmaterial

Tab. 3 Ergebnisse der multiplen linearen Regressionsanalysen – Zusammenhang zwischen sexueller Orientierung und depressiven Symptomen (gewichtet). DEAS-Studie, 2017.

	depressive Symptome				
	gesamte Stichprobe	Mann	Frau	40–64 Jahre alt	65+
sexuelle Minderheiten (Ref.: Heterosexuelle)					
– Homosexuelle	0,62 (–0,94–2,18)	0,45 (–1,59–2,49)	0,61 (–1,90–3,11)	0,02 (–1,73–1,76)	2,20 (–0,49–4,89)
– Bisexuelle	1,26 (–0,78–3,30)	–0,20 (–1,50–1,09)	2,29 (–0,82–5,41)	2,05 (–1,64–5,73)	0,98 (–0,27–2,24)
Geschlecht (Ref.: Mann)					
– Frau	0,58* (0,11–1,04)	–	–	0,69* (0,08–1,30)	0,25 (–0,41–0,91)
Alter in Jahren	–0,07*** (–0,11 bis –0,03)	–0,08** (–0,14 bis –0,02)	–0,05* (–0,10 bis –0,00)	–0,09** (–0,15 bis –0,03)	0,01 (–0,04–0,07)
Bildung Bildungsniveau nach ISCED (Ref.: niedrig)					
– mittel	–1,83** (–3,13 bis –0,52)	–2,56+ (–5,30–0,17)	–1,33+ (–2,77–0,10)	–2,58* (–4,64 bis –0,51)	–0,67 (–2,08–0,73)
– hoch	–1,64* (–2,99 bis –0,28)	–1,89 (–4,69–0,91)	–1,76* (–3,29 bis –0,23)	–1,91+ (–4,03–0,22)	–1,43+ (–2,87–0,01)
monatliches (logarithmiertes) Nettohaushaltseinkommen	–0,54+ (–1,10–0,03)	–0,62 (–1,48–0,24)	–0,41 (–1,14–0,31)	–0,66+ (–1,33–0,00)	–0,10 (–1,13–0,93)
Kreistyp (Ref.: Kreisfreie Großstädte)					
– städtische Kreise	0,26 (–0,27–0,79)	0,19 (–0,47–0,85)	0,28 (–0,53–1,09)	0,42 (–0,31–1,16)	0,10 (–0,57–0,77)
– ländliche Kreise mit Verdichtungsansatz	–0,28 (–0,96–0,40)	–0,27 (–1,17–0,63)	–0,22 (–1,20–0,76)	–0,24 (–1,08–0,60)	–0,32 (–1,40–0,77)
– dünn besiedelte ländliche Kreise	0,80+ (–0,02–1,63)	0,54 (–0,56–1,63)	1,09+ (–0,07–2,26)	1,14* (0,06–2,22)	–0,06 (–1,13–1,01)
Region (Ref.: Westdeutschland)					
– Ostdeutschland	–0,04 (–0,64–0,56)	–0,10 (–0,90–0,69)	0,08 (–0,79–0,96)	–0,19 (–0,96–0,58)	0,57 (–0,26–1,39)
Erwerbsstatus (Ref.: Erwerbstätig)					
– im Ruhestand	–0,41 (–1,17–0,34)	0,15 (–0,90–1,19)	–1,06+ (–2,14–0,03)	–0,34 (–1,56–0,88)	–1,40 (–4,15–1,34)
– sonstige (nicht Erwerbstätige)	0,51 (–0,63–1,64)	–0,36 (–1,99–1,27)	0,63 (–0,83–2,09)	0,60 (–0,65–1,84)	–0,94 (–4,10–2,22)
körperliche Funktionsfähigkeit (von 0 = schlechteste Bewertung bis 100 = beste Bewertung)	–0,04*** (–0,06 bis –0,02)	–0,04*** (–0,07 bis –0,02)	–0,04*** (–0,07 bis –0,02)	–0,05*** (–0,08 bis –0,03)	–0,04** (–0,06 bis –0,01)
subjektive Gesundheit (von 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht)	2,30*** (1,89–2,72)	2,11*** (1,54–2,67)	2,49*** (1,92–3,07)	2,24*** (1,66–2,82)	2,22*** (1,72–2,72)
Anzahl körperlicher Erkrankungen (von 0–11)	0,33*** (0,19–0,47)	0,28** (0,10–0,46)	0,39*** (0,19–0,60)	0,44*** (0,23–0,65)	0,20* (0,04–0,35)
Partnerschaftsstatus (Ref.: partnerlos)					
– mit Partner	–0,66+ (–1,32–0,00)	–1,42** (–2,48 bis –0,35)	–0,22 (–1,05–0,62)	–0,54 (–1,44–0,36)	–0,73 (–1,66–0,21)
Raucherstatus (Ref.: nein)					
– ja	–0,01 (–0,63–0,60)	0,30 (–0,48–1,08)	–0,19 (–1,12–0,75)	–0,16 (–0,91–0,59)	0,21 (–0,79–1,21)
Häufigkeit von alkoholischen Getränken (Ref.: Täglich)					
– mehrmals in der Woche	0,46 (–0,20–1,12)	0,43 (–0,36–1,22)	0,52 (–0,63–1,66)	0,34 (–0,62–1,31)	0,68 (–0,21–1,58)
– 1-mal in der Woche	–0,07 (–0,78–0,64)	–0,29 (–1,09–0,52)	0,22 (–1,07–1,51)	–0,38 (–1,40–0,64)	0,51 (–0,48–1,49)
– 1- bis 3-mal im Monat	0,40 (–0,44–1,24)	0,36 (–0,73–1,44)	0,48 (–0,88–1,83)	0,08 (–1,17–1,32)	0,93+ (–0,14–2,00)
– seltener	0,31 (–0,46–1,07)	0,77 (–0,40–1,95)	0,22 (–0,95–1,39)	0,05 (–1,05–1,15)	0,71 (–0,26–1,68)
– nie	1,16* (–0,46–1,07)	0,00 (–0,40–1,95)	2,10** (–0,95–1,39)	1,14 (–1,05–1,15)	0,87+ (–0,26–1,68)

	(0,23–2,09)	(–1,09–1,09)	(0,64–3,57)	(–0,25–2,53)	(–0,16–1,90)
Häufigkeit von sportlichen Aktivitäten (Ref.: täglich)					
– mehrmals pro Woche	–0,46 (–1,49–0,57)	–0,27 (–1,67–1,13)	–0,76 (–2,14–0,63)	–0,24 (–1,58–1,10)	–0,44 (–2,00–1,13)
– 1-mal pro Woche	0,27 (–0,80–1,35)	0,43 (–1,01–1,88)	0,08 (–1,37–1,53)	0,67 (–0,73–2,07)	–0,08 (–1,65–1,50)
– 1- bis 3-mal im Monat	–0,59 (–1,80–0,63)	–0,20 (–1,81–1,41)	–1,02 (–2,75–0,70)	–0,16 (–1,72–1,41)	–1,15 (–2,95–0,65)
– seltener	0,34 (–0,88–1,56)	0,18 (–1,40–1,77)	0,69 (–1,10–2,47)	0,87 (–0,66–2,40)	–0,56 (–2,49–1,38)
– nie	–0,04 (–1,15–1,07)	0,09 (–1,48–1,65)	–0,22 (–1,69–1,25)	0,44 (–1,11–1,99)	–0,58 (–2,10–0,93)
Beobachtungen	4.559	2.341	2.218	2.035	2.524
R ²	0,280	0,275	0,293	0,302	0,262

Anmerkungen: Alter in Jahren, Geschlecht (Frau/Mann), Partnerschaftsstatus (partnerlos; mit Partner im HH oder mit Partner ohne gemeinsamen HH), Region (Westdeutschland; Ostdeutschland), Kreistyp (kreisfreie Großstadt; städtischer Kreis; ländlicher Kreis mit Verdichtungsansatz; dünn besiedelter ländlicher Kreis [16]), Bildung nach ISCED; 1–6 (niedrig 1–2; mittel 3–4; hoch 5–6 [17]), Erwerbsstatus (erwerbstätig; verrentet; andere: nicht erwerbstätig), monatliches Nettohaushaltseinkommen (neue OECD-Skala), Lebensstilbezogene Kovariaten: Raucherstatus (1=ja, gegenwärtig Raucher; 0=nein, gegenwärtig kein Raucher), Tage mit Alkoholkonsum und Tage mit Sport (jeweils: täglich; mehrmals in der Woche; 1-mal in der Woche; 1- bis 3-mal im Monat; seltener; nie), Gesundheitsbezogene Kovariaten: subjektive Gesundheit (von 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht), die körperliche Funktionsfähigkeit (Subskala „Körperliche Funktionsfähigkeit“ des SF-36 [18]; von 0–100, wobei hohe Werte eine gute körperliche Funktionsfähigkeit reflektieren), Anzahl körperlicher Erkrankungen (von 0–11),

Unstandardisierte Beta-Koeffizienten werden dargestellt; 95%-Konfidenzintervalle in Klammern;

*** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05, + p<0,10